

L'ÉVALUATION

Notre évaluation porte sur plusieurs aspects :

- Habitude(s) orale(s)
- Aspect global au repos
- Respiration
- Résonance
- Mécanisme oral périphérique : lèvres, langue, dents, palais, etc.
- Déglutition (avaler)
- Articulation des sons

L'INTERVENTION

L'intervention au niveau de l'articulation et de la déglutition est souvent plus intensive (1 x semaine) au début du suivi. En effet, pour développer de nouveaux patrons moteurs pour articuler/déglutir et-ou de bonnes habitudes orales, un suivi plus serré est souvent requis. Pour bien vous guider, il faut s'assurer que les exercices sont réussis en clinique et que vous et-ou votre enfant les comprenez afin de bien pouvoir les reprendre dans le confort de votre foyer.

L'ENGAGEMENT

Votre engagement est primordial lors d'une intervention au niveau de l'articulation et-ou de la déglutition. En fait, c'est essentiel! Si vous avez de la difficulté à mettre en application certains exercices transmis, il faut absolument nous en parler et trouver des solutions.



En cas de manque d'assiduité de façon répétée, nous pourrions vouloir reporter l'intervention. C'est donc bien important de choisir le bon moment pour débiter ce genre de démarche et ce, pour votre progression et entière satisfaction.

TOM : DÉFINITION (AQOA)

Le trouble orofacial myofonctionnel (TOM) est un trouble qui fait référence à une fonction musculaire inappropriée et/ou à de mauvaises habitudes impliquant la langue, les lèvres, la mâchoire et le visage. Il existe une variété de TOM, mais le plus commun demeure la propulsion linguale. Le TOM est également connu dans la population générale sous le nom de « déglutition atypique », un terme qui ne fait référence qu'à un élément possible de la problématique.

Lors de la déglutition et/ou de l'articulation et/ou de la posture de la langue au repos, le TOM peut contribuer au développement non optimal du visage, et au développement/maintien d'une malocclusion et d'un mauvais alignement des dents. Il peut également provoquer une récurrence du traitement orthodontique et des problèmes au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. Il y aurait 38 % de TOM dans la population en général et 81% de TOM chez les enfants avec un trouble d'articulation.

L'ORTHOPHONISTE

« L'orthophoniste est le-la professionnel-le responsable de l'évaluation et de l'intervention auprès personnes qui présentent un TOM. L'évaluation et la mise en place d'un suivi peuvent être entreprises dès l'âge de 4-5 ans. Le rôle de l'orthophoniste est d'aider son-sa patient-e à rétablir des patrons moteurs appropriés pour une respiration, déglutition, mastication, articulation et posture adéquates. Il-Elle l'accompagne également à réduire ses habitudes orales nuisibles (ex.: sucer le pouce, ronger les ongles, bruxisme, etc.) et établir des liens avec les autres professionnel-le-s impliqué-e-s dans le traitement (orthodontiste, dentiste, ORL, etc.). » A.Q.O.A.



TARIFS

Orthophonie :

120\$/heure

80\$/consultation 40 minutes

Des reçus vous seront émis à chaque rencontre.

NOS COORDONNÉES

Succursale Saint-Jérôme :

140, rue de Martigny Ouest.

Saint-Jérôme (Québec)

T: 450-436-2525

Succursale Polyclinique Concorde :

300, boulevard de la Concorde Est.

Laval (Québec)

T: 450-436-2252

centreboucheaoreille@outlook.com

www.centreboucheaoreille.com

AUTRE(S) RÉFÉRENCE(S)

- ORL
- Orthodontiste
-



ARTICULER

&

DÉGLUTIR

**NOUS POUVONS
INTERVENIR!**

Faire la différence,

ENSEMBLE



le changement